

## 手術を受けられる方へ 説明・同意書

私は、患者 \_\_\_\_\_ 殿に対して、下記手術の必要性、危険性、及び合併症などについて説明しました。

1. 手術名称 : 二重手術（埋没法）・全切開・上眼瞼脱脂術

2. 手術内容 : 局所麻酔下に、上記手術を施行します。  
埋没法の場合、細い医療用ナイロン糸で瞼の中に結び目を埋め、重瞼線（二重のライン）を作成します。全切開を行う場合は、上眼瞼を切開し縫合します。  
また、脱脂術を行う場合はこの切開部から脂肪を切除します。

4. 術中術後の危険性 : 局所麻酔、手術、術後の経過を通じて以下の危険性があります。  
必発する症状 : 手術をした部位が腫れます。個人差はありますが数日で消失します。  
早期の併発症 : 感染、出血、アレルギー、血腫の形成を引き起こす可能性があります。  
上記により創部が離開する可能性があります。  
離開した場合、治癒が遅延したり、傷跡が目立ったり可能性があります。  
晩期の併発症 : 症状の残存、再発が生じる可能性があります。  
目の見た目に左右差が生じる可能性があります。  
糸へのアレルギー反応が生じる可能性があります。  
理想通りの重瞼線にならないことがあります。  
結果として施術前よりもお気に召さない外見になる可能性があります。

上記何れかの理由により処置や再手術が必要となる可能性があります。  
また、再手術をしても修正できない場合もあります。

5. 術後経過 : 手術当日の入浴は禁止です。また、絆創膏は貼付したままにしておいてください。  
翌朝絆創膏は外して構いません。洗顔・入浴も翌日から可能ですが、目の周りはやさしく洗ってください。  
お化粧は、術後2日間は控えてください。  
コンタクトレンズの使用は、7日間は控えてください。  
術後7日間は激しい運動は避けてください。上記合併症の発生率が高くなります。  
切開の場合は術後数日で抜糸を行います。お取りしたご予約通りにお越し下さい。  
腫れが引き二重幅が安定するまで、3-6 か月程度かかります。また、術後に埋没法糸を除去しても重瞼線が消失しない可能性があります。

7. その他 : この同意書の内容、手術前後の説明に分からないことや、術後経過で気になることがありましたら、いつでもお聞き下さい。

年 月 日 説明医師 印

私は、上記内容の説明を医師から受け、麻酔・手術・検査が行われることに同意します。  
なお、この手術・検査実施中に、緊急処置が必要となった場合には、その処置を受けることについても同意します。

年 月 日

患者氏名 \_\_\_\_\_ 印  
親族または代理者氏名 \_\_\_\_\_ 印（続柄 \_\_\_\_\_）